

KONTROLTIDER:

ANTIPSYKOTIKA OG STEMNINGSTABILISERENDE:

	Før behandling	2 uger	4 uger	8 uger	12 uger	Årligt
Anamnese	+	+	+	+	+	+
Vægt	+	+	+	+	+	+
BMI	+	+	+	+	+	+
Taljeomfang	+					+
Blodtryk	+				+	+
HbA1c+ lipider	+				+	+
Alm. blodprøver	+					+
EKG	+	+			+	+

ANTIDEPRESSIVA:

	Før behandling	Ved 50% dosisøgning	Ved vedligeholdelsesdosis	Årligt
Anamnese	+	+	+	+
Vægt	+			+
BMI	+			+
Blodtryk	+			+
Alm. blodprøver	+			+
EKG	+	+	+	+

LITHIUMBEHANDLING:

	Før behandling	1-2 uger	Ved 50% dosisøgning	Ved vedligeholdelsesdosis	Hver 3./6. måned*	Årligt
Anamnese	+	+	+	+	+	+
Vægt	+					+
BMI	+					+
Blodtryk	+					+
Alm. blodprøver	+					+
Lithiumprøver		+	+	+	+	+
EKG	+	+	+	+	+	+

*Hver 3. måned de første 3 år, derefter evt hver 6. måned